

| Maßnahmenblatt K2 Anlage Fettweide mittlerer Standorte | | |
|---|---|-------------------|
| Maßnahme: | K2 | Verweis |
| Art der Maßnahmen: | Kompensation (K) | |
| Lage der Maßnahme: | siehe Karte Nr. 6 | Flurstück: 3488/6 |
| Auslösender Konflikt: | Aufwertung Ackerflächen | |
| Ziel der Maßnahme | Neuanlage von Fettweide | |
| Beschreibung der Maßnahme | <p>Anlage mäßig artenreicher bis artenarmer Weide. Mögliche Arten sind: Glatthafer (<i>Arrhenatheraum elatius</i>), Wiesen-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Wucherblume (<i>Leucanthemum ircutianum</i>), Gewöhnlicher Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Wiesen-Glockenblume (<i>Campanula patula</i>), Wiesen-Bocksbart (<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>orientalis</i>), Gewöhnlicher Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Breitblättrige Platterbse (<i>Lathyrus latifolius</i>), Wilde Platterbse (<i>Lathyrus sylvestris</i>), Gänseblümchen (<i>Bellis perennis</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Gewöhnliches Ferkelkraut (<i>Hypochaeris radicata</i>), Deutsches Weidelgras (<i>Lolium perenne</i>), Wiesen-Lieschgras (<i>Phleum pratense</i>), Mittlerer Wegerich (<i>Plantago media</i>), Einjährige Rispengras (<i>Poa annua</i>), Kleine Braunelle (<i>Prunella vulgaris</i>), Kriechender Hahnenfuß (<i>Ranunculus repens</i>), Herbst-Löwenzahn (<i>Scorzoneroidea autumnalis</i>), Weißklee (<i>Trifolium repens</i>), Quendel-Ehrenpreis (<i>Veronica serpyllifolia</i>).</p> <p>Ansaatstärke: 5- 10 g/m². Die Einsaat hat mit autochthoner Saatgutmischung zu erfolgen.</p> | |
| | Die Maßnahme muss durch Pflege entwickelt und erhalten werden. 1 Schröpfschnitt sowie eine Mahd zur Nachpflege der Weide nötig. | |
| Fläche | ca. 560 m ² | |
| Zeitpunkt der Durchführung | ab Oktober | |
| Dauer der Maßnahme | Je nach Witterungsverlauf ca. 2 Wochen | |
| Rechtliche Sicherung | Auflage | |